

УВАГА!!! АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)



АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС) — це висококонтагіозна інфекційна хвороба. Клінічні ознаки та патанатомічні зміни нагадують гостру форму класичної чуми свиней.

АЧС не становить небезпеки для людини і не передається від тварини до людини.



ЗБУДНИК

ДНК-вмісний вірус в оболонці роду *Asfivirus* родини *Asfaviridae*. Його знаходять в крові, лімфі, у внутрішніх органах, екскрементах хворих тварин. Вірус АЧС має кілька генотипів. В Україні виявлено 2 генотип, який також поширений у країнах Кавказу, Російської Федерації, Білорусії, Прибалтики та Польщі.

СТІЙКІСТЬ ВІРУСУ

- ✓ У тканинах свиней: 18–20 °С — до 18 місяців; 37 °С — до місяця.
- ✓ У трупах свиней до 3 місяців.
- ✓ У крові, яку зберігали при кімнатній температурі, вірус залишався життєздатним упродовж 10–18 тижнів (якщо її тримати в темному холодному приміщенні, то до 6 років).
- ✓ В охолоджених тушах (4 °С) — півроку, у замороженому м'ясі (–20 °С) — безкінечно.
- ✓ У копченій ковбасі впродовж 5 місяців і більше.
- ✓ У ґрунті залежно від пори року: 4 місяці (літо–осінь), до 8 місяців (осінь–весна).
- ✓ При 50 °С гине впродовж години.
- ✓ Вірус АЧС виживає і за несприятливих умов: висихання та гниття. Він не боїться сонячного проміння.
- ✓ Вірус АЧС відчуває себе комфортно, коли рН дорівнює 3–10. Однак 1% формальдегід знищує його за 6 днів, а 2% гідроксид натрію — за добу.


ПАТОГЕНЕЗ

Головний маршрут, яким вірус АЧС потрапляє в організм свиней, — верхні дихальні шляхи. Зараження також можливе через пошкоджені ділянки шкіри, внутрішньом'язово, підшкірно та внутрішньовенно (укус кліщів).

Тварини, які перехворіли на АЧС і вижили, залишаються носіями: віремія не припиняється, незважаючи на присутність у крові великої кількості антитіл.



Загибель свиней при захворюванні АЧС – 100%



УВАГА!!! АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)



ОСНОВНІ СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ

Безпосередньо



— контакт здорових і хворих тварин.

Опосередковано



— через персонал, який тримає свиней удома чи рухається між господарствами під час спалаху АЧС, а також через інструменти і робочий одяг працівників ферми;



— через транспортні засоби;



— через продукти зі свинини чи згодовування відходів інфікованої туші;



— через заражений вірусом корм, підстилку;



— через механічні вектори: хижі птахи та звірі, гризуни, комахи, нашірні паразити (деякі види кліщів та вошей).

ВАКЦИНИ ВІД АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ – НЕ ІСНУЄ!!!

Профілактика АЧС

1. Щоденний огляд тварин.
2. Не купувати корми і кормові добавки невідомого походження в невстановлених торгових місцях.
3. Не згодовувати тваринам харчові відходи і відходи, отримані після забою свиней; виключити з раціонів інгредієнти тваринного походження.
4. Не купувати живих свиней, м'ясо і м'ясопродукти в неустановлених торгових точках, без ветеринарних супроводжуючих документів; не завозити/вивозити свиней і продукцію свиначства без дозволу державної ветеринарної служби, реєструвати свинопоголів'я.
5. Регулярно чистити та дезінфікувати виробничі приміщення.
6. Проводити заходи із боротьби з гризунами та комахами.
7. Не допускати відвідувати виробничі корпуси стороннім.
8. Утримувати свиней в закритих приміщеннях або надійно обгороджених, ізольованих місцях, не допускати вільного вигулу свиней, контакту з іншими тваринами.
9. Не проводити подвірний забій і реалізацію свинини без ветеринарного передзабійного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та продуктів забою фахівцями державної ветеринарної служби.




ЩО РОБИТИ?

При підозрі на захворювання Африканської чуми свиней слід відразу звернутись до державної ветеринарної служби району (області).

САМОЛІКУВАННЯ ТВАРИН КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО!!!




Загибель свиней при захворюванні АЧС – 100%



УВАГА!!! АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)

Кілька сценаріїв проникнення АЧС



Загибель свиней при захворюванні АЧС – 100%

УВАГА!!! АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)



Клінічні ознаки

Скільки часу проходить з моменту зараження тварини до прояву клінічних ознак хвороби?

Інкубаційний період може тривати від 3 до 15 діб. При гострому перебігу хвороби – 5-9 діб.

Чи хворіють люди на АЧС?

Ні! Люди на хворіють на АЧС.


Які тварини хворіють на АЧС?

Лише домашні та дикі свині, незалежно від породи, віку та статі.

Якщо Ви помітили схожі ознаки негайно сповістіть ветеринарного лікаря!

Що станеться, якщо не повідомити про підозру на АЧС?

Хвороба може швидко поширитись на сусідні господарства, завдаючи значних економічних збитків внаслідок загибелі свиней та ліквідації всього свинопоголів'я в регіоні.



Матеріальне відшкодування збитків, внаслідок вилучення тварин, компенсується власникам за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.



Загибель свиней при захворюванні АЧС – 100%

