

## Жидкие и водорастворимые концентраты (Чехия)

Е+SE AST	температурная антистрессовая композиция	4
В КОМПЗИТУМ	водорастворимый концентрат витаминов группы В	6
С КОМПЗИТУМ	водорастворимый концентрат витамина С	8
СУПЕРВИТ	мультивитаминный водорастворимый концентрат	10
ВИТАМИКС SE	водорастворимый концентрат с содержанием витамина Е и селена	12
КОМБИСОЛ А	жидкий концентрат витамина А	14
КОМБИСОЛ ДЗ	жидкий концентрат витамина ДЗ	16
КОМБИСОЛ КЗ	жидкий концентрат витамина КЗ	18
КОМБИСОЛ Е	жидкий концентрат витамина Е	20
АМИНОСОЛ	комплекс гидрофильных витаминов, аминокислот и солей в жидкой форме	22



**Антистрессовая композиция AST**



## Температурная антистрессовая композиция

Состав (содержание действующих веществ в 1 кг):

	AST СТАНДАРТ	AST ПЛЮС
Витамин Е	10 000 мг	67 000 мг
Селен	50 мг	150 мг
Витамин С	100 000 мг	100 000 мг
Магний	30 000 мг	30 000 мг
Натрий	82 540 мг	82 540 мг
Калий	1 150 мг	1 150 мг
Лимонная кислота	15 000 мг	15 000 мг

### Показания:

Водорастворимая композиция E + Se AST помогает перенести стресс при:

- высоких температурах окружающей среды, особенно в летний период;
- недостаточном воздухообмене в помещении;
- колебаниях температур и давления воздуха.

### Дозировка и способ введения:

Препарат растворяют в питьевой воде из расчета 1г порошка на 1л воды и выпаивают в течение 3 – 4 дней. При длительном воздействии высоких температур назначают повторные курсы с интервалом 3 – 4 дня.

При включении в питьевую воду суточную дозу препарата основательно смешивают с небольшим объемом воды (в отношении 1:10) и в таком виде вводят в поилки или в танк с питьевой водой.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Упаковка: 10 кг





# КОМПОЗИТУМ

Водорастворимый концентрат  
витаминов группы В



# Композитум

## Водорастворимый концентрат витаминов группы В

Состав (содержание действующих веществ в 1 кг):

Витамин В1	3 000 мг	Ниацин	40 000 мг
Витамин В2	6 000 мг	Витамин В12	10 мг
Витамин В6	5 000 мг	Витамин Н (биотин)	40 мг
Пантотенат кальция	15 000 мг	Инозитол	2 000 мг
		Наполнитель	до 1 кг

СВИНОВОДСТВО	ПТИЦЕВОДСТВО
<p><b>Показания:</b></p> <p>При авитаминозах группы В. После стресса, в период высокой продуктивности, интенсивного роста. Для улучшения воспроизводительной функции животных и сокращения эмбриональной смертности; для правильного развития плода и повышения жизнеспособности детёнышей. Препарат вводят также при наличии расстройств со стороны кожи и шерсти, расстройств нервной системы, при анемии и некоторых расстройствах функции пищеварительного аппарата. Назначают его в течение и после лечения антибиотиками, сульфаниламидными препаратами и антикокцидиостатиками.</p>	<p><b>Показания:</b></p> <p>При авитаминозах группы В. После стресса, в период высокой продуктивности, интенсивного роста. Для улучшения воспроизводительной функции животных и сокращения эмбриональной смертности; для правильного развития плода и повышения жизнеспособности детёнышей. У птицы для увеличения биологической ценности инкубационных яиц и улучшения их оплодотворенности и выводимости. Препарат вводят также при наличии расстройств со стороны оперения, расстройств нервной системы, при анемии, перозе и некоторых расстройствах функции пищеварительного аппарата. Назначают его в течение и после лечения антибиотиками, сульфаниламидными препаратами и антикокцидиостатиками.</p>

Способ введения: в течение 5 - 10 дней

- *с питьевой водой* - суточную дозу препарата тщательно смешивают с небольшим объемом воды (в отношении 1:10) и в таком виде вводят в поилки или в танк с питьевой водой.
- *с кормом* - суточную дозу препарата тщательно перемешивают с небольшим объемом корма и затем смешивают с суточным рационом.

Дозировка:	Дозировка:	Профилактическая суточная доза:
<p><i>Профилактическая суточная доза:</i></p> <p>Поросятам 0,5 г/1 гол.</p> <p>Свиньям (20 - 50 кг ж.м.) 3-6 г/1 гол.</p> <p>Свиноматкам, хрякам 3-6 г/1 гол.</p>	<p>Молодой птице до 3-нед. возраста 0,1-0,5 г/10 птиц</p> <p>Молодой птице старше 3-нед. возр. 0,5-1,0 г/10 птиц</p> <p>Курам, фазанам, уткам, цесаркам 1-2 г/10 птиц</p> <p>Гусям, индейкам 4-5 г/10 птиц</p> <p>Страусам (взрослым, 50 - 100 кг ж.м.) 2-4 г/1 птица</p> <p>Голубям, перепелам, куропаткам 0,5 г/10 птиц</p>	

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Упаковка: 10 кг



для тех, кто работает...

# АГРОTex





# КОМПОЗИТУМ

Водорастворимый концентрат  
витамина С



# Композитум

## Водорастворимый концентрат витамина С

Состав (содержание действующих веществ в 1 кг):

	<b>С-КОМПОЗИТУМ 25%</b>	<b>С-КОМПОЗИТУМ 50%</b>
Витамин С	250 000 мг	500 000 мг
Наполнитель	до 1 кг	

СВИНОВОДСТВО	ПТИЦЕВОДСТВО
<p><b>Показания:</b></p> <p>Усиливает иммунные свойства организма. Применяется после стресса, вызванного транспортировкой или колебаниями температуры и пр. При дерматозах, анемиях, кровотечениях, при расстройствах воспроизводства и для стимуляции заживления ран и переломов.</p>	<p><b>Показания:</b></p> <p>Усиливает иммунные свойства организма. Применяется после стресса, вызванного транспортировкой или колебаниями температуры и пр. При дерматозах, анемиях, кровотечениях, при расстройствах воспроизводства и для стимуляции заживления ран и переломов. У птицы положительно влияет на яйценоскость и качество скорлупы, для оптимального развития эмбрионов цыплят и правильного их развития в прединкубационный период.</p>

**Способ введения:**

- *с питьевой водой* - суточную дозу препарата тщательно смешивают с небольшим объемом воды (в отношении 1:10) и в таком виде вводят в поилки или в танк с питьевой водой.
- *с кормом* - суточную дозу препарата тщательно перемешивают с небольшим объемом корма и затем смешивают с суточным рационом.
- Профилактика: 5 - 25 дней.
- В терапевтических дозах (т.е. 2-3х выше профилактических) - 5 - 7 дней.
- Применение препарата можно повторить через 2-4 недели.

Дозировка:		Дозировка:	
<i>С КОМПОЗИТУМ 25%</i>	<i>С КОМПОЗИТУМ 50%</i>	<i>С-КОМПОЗИТУМ 25%</i>	<i>С-КОМПОЗИТУМ 50%</i>
<i>Поросятам</i>		<i>Молодой птице до 3-нед. возраста</i>	
50-150 мг/1 гол.	25-75 г/1 гол.	400-2000 мг/100 птиц	200-1000 мг/100 птиц
<i>Свиньям</i>		<i>Откорм и выращивание птицы старше 3-нед. возраста</i>	
800-1200 мг/1 гол.	400-600 г/1 гол.	1500-4000 мг/100 птиц	750-2000 мг/100 птиц
<i>Свиноматкам, хрякам</i>		<i>Курам, фазанам, цесаркам, гусям, уткам</i>	
4000-6000 мг/1 гол.	2000-3000 г/1 гол.	800-1200 мг/10 птиц	400-600 мг/10 птиц
		<i>Голубям, перепелам, куропаткам</i>	
		50-200 мг/10 птиц	25-100 мг/ 10 птиц
		<i>Индейкам</i>	
		200-400 мг/1 птица	100-200 мг/ 1 птица

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления  
Упаковка: 10 кг



# Супервит



Мультивитаминный  
водорастворимый концентрат



# Супервит

## Мультивитаминный водорастворимый концентрат

Состав (содержание действующих веществ в 1 кг):

Витамин А	5 000 000 м.е.	Пантотеновая	6 000 мг
Витамин D3	500 000 м.е.	кислота	
Витамин Е	10 000 мг	Витамин С	10 000 мг
Витамин В1	2 000 мг	Витамин В12	10 мг
Витамин В2	4 000 мг	Фолиевая кислота	500 мг
Витамин В6	2 000 мг	Биотин	30 мг
Ниацин	15 000 мг	Наполнитель	до 1 кг

### СВИНОВОДСТВО

### ПТИЦЕВОДСТВО

#### Показания:

В период физиологической нагрузки организма или стресса, для всех видов и категорий сельскохозяйственных животных. Для повышения жизнеспособности детёнышей после рождения и отъёма, для поддержки их оптимального роста и развития. Препарат оказывает положительное действие на воспроизводительную способность и правильный ход беременности и лактации. Он удобен для улучшения кондиции и состояния здоровья животных.

#### Показания:

В период физиологической нагрузки организма или стресса, для всех видов и категорий птицы. Для улучшения биологической ценности инкубационных яиц, увеличения их оплодотворенности и выводимости и для сохранения интенсивной яйцекладки. Для поддержки правильного роста и развития молодой птицы в откорме и выращивании, для улучшения их жизнеспособности и хорошего состояния здоровья. Препарат назначают также для усиления обороноспособности организма при различных заболеваниях.

#### Способ введения:

Суточную дозу препарата перед применением растворяют с небольшим объёмом питьевой воды (в отношении 1:10) и в таком виде вводят в поилки или в танк с питьевой водой в течение 4-5 дней. Употребление можно продлить или повторить через 3-4 недели. Препарат можно вводить также хорошо смешанный с кормом.

#### Дозировка:

Суточная доза на  
10 кг ж.м. животных: 0,5 - 1 г

*Суточная доза на 1 гол.:*

Поросёнку	2 - 3 г
Свинье (20 - 50 кг ж.м.)	2 - 5 г
Свинье (50 - 120 кг ж.м.)	5 - 10 г
Свиноматке, хрюке	10 - 20 г

#### Дозировка:

Суточная доза на 10 кг  
ж.м. домашней птицы 1,5 - 2 г

*Суточная доза на количество птиц:*

Курам, фазанам	2,5 - 3 г/10 птиц
Уткам, цесаркам	3 - 4 г/10 птиц
Индейкам, гусям	4 - 5 г/10 птиц
Голубям, перепелам, куропаткам	0,5 - 1 г/10 птиц
Молодой птице до 4-х нед. возраста	1 - 2 г/10 птиц
Молодой птице старше 4-х нед. возраста	2 - 3 г/10 птиц

Способ хранения: В сухом месте, защищая от света

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Упаковка: 10 кг



для тех, кто работает...

**АГРОТех**

# Витамикс



Водорастворимый концентрат с  
содержанием витамина Е и селена



# Витамикс SE

## Водорастворимый концентрат с содержанием витамина Е и селена

Состав (содержание действующих веществ в 1 кг):

Витамин Е	67 000 мг
Селен	300 мг
Наполнитель	до 1 кг

СВИНОВОДСТВО	ПТИЦЕВОДСТВО
<p><b>Показания:</b></p> <p>Препарат применяется при стрессе, дефицитном питании, прежде всего с целью предотвращения развития эндокринных расстройств и изменений двигательного аппарата, в качестве вспомогательного средства при лечении заболеваний сердца и сосудов. Витамикс SE также поддерживает половую активность племенных животных, а у откормочных животных он улучшает качество мяса, действуя против внезапной смертности в течение последней фазы откорма мясных свиней.</p>	<p><b>Показания:</b></p> <p>Препарат снижает внезапную смертность в откорме птицы. Препарат применяют в профилактических и терапевтических целях при некоторых эндокринных расстройствах, при дефицитном питании (алиментарная энцефаломалиция и экссудативный диатез), при наличии мышечных миопатий и в связи с дегенеративными и пролиферативными изменениями двигательного аппарата. Витамикс SE также поддерживает половую активность племенных животных. У откармливаемых животных он улучшает качество мяса.</p>

**Способ введения:**

- *с питьевой водой* - суточную дозу препарата тщательно смешивают с небольшим объемом воды (в отношении 1:10) и в таком виде вводят в поилки или в танк с питьевой водой.
- *с кормом* – суточную дозу препарата тщательно перемешивают с небольшим объемом корма и затем смешивают с суточным рационом.

**Дозировка:**

Витамикс SE назначают поросятам, свиньям в нижеприведенных дозах в течение 3-5 дней. Свиньям мясного типа препарат вводят на протяжении 4 недель откорма.

*Суточная доза препарата:*

Поросятам	3 г/10 голов
Свиньям	3 г/100 кг ж.м.

В случаях острого состояния дозы можно увеличить не более, чем в два раза. Большее увеличение доз не рекомендуется.

**Дозировка:**

Витамикс SE назначают в нижеприведенных дозах в течение 3-5 дней. Птице препарат назначают в течение 5-7 дней, причем применение можно повторить через три недели.

*Суточная доза препарата:*

Домашней птице	0,6-1,0 г/10 птиц (30-50 г/100 л питьевой воды)
----------------	--

В случаях острого состояния дозы можно увеличить не более, чем в два раза. Большее увеличение доз не рекомендуется.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления  
Упаковка: 8 кг



# Комбисол



Жидкий концентрат витамина А



# Комбисол

## Жидкий концентрат витамина А



Состав (содержание действующих веществ в 1 кг):

Витамин А (Retionoli palmitas) 150 000 м.е. в 1 мл

Показания:

- Пониженная резистентность к инфекционным болезням, особенно пищеварительного тракта и дыхательных путей
- Плохой рост и карликовость детенышей,
- При некоторых расстройствах воспроизводства,
- При дерматозах разного типа и при дефектах кожи,
- При расстройствах слизистых оболочек и зрения - ночная слепота, ксерофтальмия.

Способ введения:

КОМБИСОЛ А дают животным после тщательного его разбавления в питьевой воде или молоке. В профилактических целях препарат вводят в течение 3-10 дней в указанных дозах. Применение можно повторять через 3-4 недели. В связи с терапевтическим введением дозировку можно увеличить согласно рекомендации ветеринарного врача. Разбавленный раствор следует защищать от прямого солнечного света и использовать как можно скорее

Дозировка:

*Курам, уткам*

1 мл/100 птиц/день

*Индейкам, гусям*

1 мл/50 птиц/день

*Цыплятам, утятам, гусятам в возрасте:*

1 недели

1 мл/400 птиц/день

2-3 недель

1 мл/200-300 птиц/день

4-6 недель

1 мл/100-200 птиц/день

выше 6 недель

1 мл/100-150 птиц/день

*Индюшатам в возрасте:*

1-2 недель

1 мл/250-300 птиц/день

3-5 недель

1 мл/150-250 птиц/день

6-10 недель

1 мл/100-150 птиц/день

выше 10 недель

1 мл/50-100 птиц/день

Хранение:

При температуре от 10 до 25°C, в темном месте

Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления, защищая от мороза

Упаковка:

1000 мл - сосуда из пластмассы



для тех, кто работает...

АГРОTex

# Комбисол



Жидкий концентрат витамина D3



# Комбисол

## Жидкий концентрат витамина D3

Состав (содержание действующих веществ в 1 кг):

Витамин D3 (Colecalciferolum)

100 000 м.е. в 1 мл

Показания:

- Расстройства метаболизма костей (рахит, остеомалация)
- Для предупреждения развития остеопороза и тиббиальной дисхондроплазии
- Сниженная яйценоскость и плохое качество яичной скорлупы
- Низкая выводимость
- Послеродовой парез в сочетании с кальциевыми препаратами
- При расстройствах обмена кальция и фосфора
- При гиповитаминозе

Способ введения:

КОМБИСОЛ D3 дают животным после тщательного его разбавления в питьевой воде или молоке. В профилактических целях препарат вводят в течение 10-20 дней в указанных дозах. Применение можно повторять. В связи с терапевтическим введением дозировку можно увеличить согласно рекомендации ветеринарного врача. Одновременное употребление витамина D2 не допускается. Разбавленный раствор следует защищать от прямого солнечного света и израсходовать как можно скорее.

Дозировка:

<i>Курам, уткам</i>	1 мл/250 птиц/день
<i>Индюшкам, гусям</i>	1 мл/150 птиц/день
<i>Цыплятам, утятам, гусятам в возрасте:</i>	
1 недели	1 мл/800-1000 птиц/день
2-3 недели	1 мл/600-800 птиц/день
4-6 недель	1 мл/300-500 птиц/день
выше 6 недель	1 мл/300 птиц/день
<i>Индюшкатам в возрасте:</i>	
1-2 недели	1 мл/700-800 птиц/день
3-5 недель	1 мл/500-700 птиц/день
6-10 недель	1 мл/300-500 птиц/день
выше 10 недель	1 мл/200-300 птиц/день

Хранение:

При температуре от 10 до 25°C, в темном месте

Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления, защищая от мороза

Упаковка:


1000 мл - сосуды из пластмассы



для тех, кто работает...

**АГРО**Tex

# Комбисол



Жидкий концентрат витамина К3



# Комбисол



## Жидкий концентрат витамина К3

Состав (содержание действующих веществ в 1 кг):

Витамин К3 (Msb-Menadionum)

50 мг в 1 мл

### Показания:

- Заболевания, сопровождающиеся кровотечением в результате пониженного свертывания крови (геморрагический синдром)
- При подкожном, мышечном и внутреннем кровотечении, коагулятах крови в яйцах
- При увеличенной эмбриональной смертности и усиленном кровотечении у цыплят после вылупления
- При алиментарных интоксикациях
- При введении лекарственных средств, содержащих химиотерапевтические препараты, в частности сульфаниламидные препараты, антибиотики
- Вспомогательно при лечении кокцидиоза

### Способ введения:

КОМБИСОЛ К3 дают животным после тщательного его разбавления в питьевой воде или молоке. В профилактических целях препарат вводят в течение 5-10 дней в указанных дозах. Применение можно повторять. В связи с терапевтическим введением дозировку можно увеличить в два раза или согласно рекомендации ветеринарного врача. Разбавленный раствор следует защищать от прямого солнечного света и израсходовать как можно скорее.

### Дозировка:

<i>Курам, уткам</i>	1 мл/100 птиц/день
<i>Индейкам, гусям</i>	1 мл/50 птиц/день
<i>Цыплятам, утятам, гусятам в возрасте:</i>	
1 недели	1 мл/400 птиц/день
2-3 недели	1 мл/200-300 птиц/день
4-6 недель	1 мл/150-200 птиц/день
выше 6 недель	1 мл/100 птиц/день
<i>Индюшатам в возрасте:</i>	
1-2 недели	1 мл/250-300 птиц/день
3-5 недель	1 мл/150-200 птиц/день
6-10 недель	1 мл/100-150 птиц/день
выше 10 недель	1 мл/80-100 птиц/день
<i>При интоксикации животных после приёма препаратов кумарина</i>	1 мл/100 кг ж.м./день

### Хранение:

При температуре от 10 до 25°C, в темном месте

### Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления, защищая от мороза

### Упаковка:

1000 мл - сосуды из пластмассы



для тех, кто работает...

# АГРОTex

# Комбисол



Жидкий концентрат витамина Е



# Комбисол Е

## Жидкий концентрат витамина Е

Состав (содержание действующих веществ в 1 кг):

Витамин Е (Alfa tokoferoli acetat) 200 мг в 1 мл

### Показания:

- Расстройства плодovitости самок и самцов
- Мышечная миопатия, мышечная дистрофия детёнышей
- Энцефаломалиция, связанная с питанием
- Экссудативный диатез домашней птицы
- Профилактика сердечно-сосудистых расстройств
- Для предупреждения внезапной смерти в заключительной фазе откорма домашней птицы
- Профилактика жировой дегенерации печени
- Наличие синдрома MMA
- При некоторых эндокринных расстройствах
- При гиповитаминозе Е

### Способ введения:

КОМБИСОЛ Е дают животным после тщательного его разбавления в питьевой воде или молоке. В профилактических целях препарат вводят в течение 3-10 дней в указанных дозах. Применение можно повторять. В связи с терапевтическим введением дозировку можно увеличить в два раза или согласно рекомендации ветеринарного врача. Разбавленный раствор следует защищать от прямого солнечного света и израсходовать как можно скорее.

### Дозировка:

Курам, уткам	1 мл/20 птиц/день
Индейкам, гусям	1 мл/10 птиц/день
Цыплятам, утятам, гусятам в возрасте:	
1 недели	1 мл/100 птиц/день
2-3 недели	1 мл/50-80 птиц/день
4-6 недель	1 мл/30-50 птиц/день
выше 6 недель	1 мл/20-30 птиц/день
Индюшатам в возрасте:	
1-2 недели	1 мл/80 птиц/день
3-5 недель	1 мл/50-70 птиц/день
6-10 недель	1 мл/30-50 птиц/день
выше 10 недель	1 мл/20-30 птиц/день

Хранение: При температуре от 10 до 25°C, в темном месте

Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления, защищая от мороза

Упаковка: 1000 мл - сосуды из пластмассы



для тех, кто работает...

АГРОTex

# АМИНОСОЛ

Имунномодулятор

Комплекс гидрофильных витаминов,  
аминокислот и солей в жидкой форме



# АМИНОСОЛ

Комплекс гидрофильных витаминов, аминокислот и солей в жидкой форме

Состав (содержание действующих веществ в 1 кг):

Витамин В1 (Thiamini hydrochloridum)	0,5 мг	Хлорид магния (Magnesii chloridum)	0,17 мг
Витамин В2 (Riboflavinum 5 fosfatum)	0,5 мг	Триптофан (Tryptophanum)	1,5 мг
Витамин В6 (Pyridoxini hydrochl.)	0,5 мг	Цистин (Cystinum)	1 мг
Пантотенат кальция (Calcii pantothenas)	1 мг	Лейцин (Leucinum)	8 мг
Витамин Н (Biotinum)	3 мкг	Изолейцин (Isolucinum)	6 мг
Никотинамид (Nicotinamidum)	2 мг	Аргинин (Argininum)	3,5 мг
Холина хлорид (Cholini chloridum)	20 мг	Валин (Valinum)	6,8 мг
Лизин (Lysinum - L)	8 мг	Треонин (Threoninum)	4,2 мг
Метионин (Methioninum - DL)	3 мг	Фенилаланин (Phenylalaninum)	3,4 мг
Хлорид натрия (Natrii chloridum)	18 мг	Глюкоза (Glucosum)	300 мг

Показания:

- Повышенная физиологическая нагрузка
- Период роста, воспроизводства, высокой интенсивности яйцекладки
- Стресс любого вида (температура, технология, питание, транспорт и т.д.)
- При сниженном приеме корма
- Для восстановления организма после болезни

Способ введения:

АМИНОСОЛ дают животным после тщательного его разбавления в питьевой воде или молоке. В профилактических целях препарат вводят в течение 5-15 дней в указанных дозах. Применение можно повторять. В связи с применением препарата после сильного напряжения или заболевания дозировку можно увеличить в два раза в течение около 3 дней. Разбавленный раствор следует защищать от прямого солнечного света и израсходовать как можно скорее.

СВИНОВОДСТВО		ПТИЦЕВОДСТВО	
Дозировка:		Дозировка:	
Поросятам (5 кг ж.м.)	1 мл/1 голову/день	Курам, уткам	1 мл/4-5 птиц/день
		Индейкам, гусям	1 мл/3-4 птицы/день
		Цыплятам, утятам, гусятам в возрасте:	
		1 недели	1 мл/50-60 птиц/день
		2-3 недель	1 мл/20-30 птиц/день
		4-6 недель	1 мл/10-20 птиц/день
		выше 6 недель	1 мл/10-15 птиц/день
		Индюшатам в возрасте:	
		1-2 недели	1 мл/60-70 птиц/день
		3-5 недель	1 мл/30-40 птиц/день
		6-10 недель	1 мл/10-20 птиц/день
		выше 10 недель	1 мл/10 птиц/день

Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления, защищая от мороза

Упаковка:

1000 мл - сосуды из пластмассы



для тех, кто работает...

АГРОTex



для тех, кто работает...

**АГРОТех**

83049, г. Донецк, ул. Хирургическая 22

Тел./факс: 062 345 45 42, 062 345 45 47

095-427-44-56

050-478-37-26