Продукция компании “Kemin”, Бельгия

Sal Curb..... для тех, кто убивает микробы

Kemzyime..... для тех, кто экономит

Lysoforte..... для тех, кто вводит много масла

Myco Curb..... для тех, кто хранит зерно

Oro Glo..... для тех, кто красит с умом

Acid Lac..... для тех, кто подкисляет

Kembind..... для тех, кто крепит гранулы

Endox, Paradiqm Ox..... для тех, кто сохраняет витамины

Butter-vanilla Aroma..... для тех, кто делает корма вкуснее

Toxfin..... для тех, кто ценит здоровье

KEMIN®

для тех, кто работает...
АГРОТех

Myco Curb

ингибитор плесени

для тех, кто хранит зерно

Myco Curb

ингибитор плесени

Последствия заражения кормов плесенью:

Плесневые грибки наносят огромный ущерб сельскому хозяйству, уменьшают питательную ценность кормов, поражают их микотоксинами. Потребление таких кормов животными приводит к микотоксикозам — тяжелым заболеваниям, часто со смертельным исходом. В некоторых регионах при соблюдении всех норм технологии переработки и хранения зерна, до 90% его поражается микотоксинами. В таких условиях единственным надежным способом борьбы с плесневыми грибками и предотвращения микотоксикозов у животных и птиц является обработка зерна и кормов Мико КАРБОМ жидким.

Описание:

Комплекс компонентов естественной природы, которые подавляют рост и размножение наиболее опасных плесневых грибков Aspergillus, Fusaruim, Penicillium, Mucor и др. в зерне и кормах.

Назначение:

- Прекращение роста и размножения плесневых грибков в зерне (в том числе, имеющем повышенную влажность), другом кормовом сырье и готовых комбикормах;
- Предотвращение поражения зерна и кормов микотоксинами.

Преимущества:

Низкая норма ввода. В отличие от фумигации обеспечивает длительную и надежную защиту от заражения кормов плесенью, полностью метаболизируется в организме животных и птиц, сохраняет активность после термической обработки, безопасен для персонала, не вызывает коррозию оборудования. В сочетании с Сал КАРБОМ применяется в «Программе гигиены кормов», разработанной фирмой «КЕМИН».

Нормы применения:

- Для зерна влажностью до 14 % — 0,5–1 кг/т;
- Для зерна влажностью до 16 % — 1–3 кг/т*;
- Для комбикорма — 0,5–1 кг/т.

* при необходимости хранения зерна с более высоким содержанием влаги желательно проконсультироваться со специалистами фирмы «КЕМИН».

Способы применения:

- Обработка зерна в шнековом транспортере или падающем потоке;
- Обработка комбикорма — непосредственно в смесителе с помощью специального дозирующего оборудования*.

* поставка дозирующего оборудования, его наладка, шеф-монтаж и гарантийное обслуживание осуществляются специалистами фирмы «КЕМИН».

Упаковка: Пластиковые контейнеры объемом 25, 200 и 1000 л.

Срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

для тех, кто хранит зерно

Oro Glo

источник натуральных каротиноидов

для тех, кто красит с умом

Oro Glo

источник натуральных каротиноидов

Состав:

Экстракт переработанных лепестков календулы, стабилизированный антиоксидантом, упакованный в герметической водонепроницаемой таре в атмосфере азота.

Свойства:

- Служит источником натуральных каротиноидов в рационе кур-несушек;
- Обеспечивает гарантированный уровень каротиноидов в инкубационных яйцах;
- Придает желтку яиц и коже тушек насыщенный желтый цвет, стабильный при всех видах тепловой обработки приготовления пищи;
- Способствует накоплению в печени каротиноидов;
- Увеличивает депонирование в желтке яиц **витамина А;**
- Улучшает инкубационные качества яиц;
- Улучшает жизнеспособность суточного молодняка.

Преимущества:

- Имеет гарантированное содержание каротиноидов (20000 мг/кг препарата);
- Не теряет активности при хранении в составе премиксов и комбикормов.

Применение:

- Курам-несушкам (племенным) — 400 г/тонну комбикорма в течение двух недель с начала применение, с последующим снижением до 200 г/тонну;
- Курам-несушкам (промышленным) — в зависимости от желаемой интенсивности окраски желтка, но не менее 200 г/тонну;
- Бройлерам — в течение двух недель до убоя в зависимости от желаемой интенсивности окраски кожи тушек, но не менее 450 г/тонну.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется включать в корма, предназначенные для грануляции.

Упаковка:

Влагонипроницаемые , герметичные заполненные в атмосфере азота мешки по 20 кг.

Внешний вид: Сыпучий порошок золотисто-желтого цвета.

Срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.



для тех, кто красит с умом

Acid Lac

пребиотик-подкислитель

для тех, кто подкисляет

Acid Lac

Пребиотик-подкислитель

Комбинация натуральных ингредиентов, обеспечивающая хорошее здоровье и максимальную продуктивность животных и птиц.

Состав:

Муравьиная, молочная, фумаровая, лимонная, пропионовая кислоты.

Свойства:

- Снижает кислотность содержимого желудка;
- Способствует росту молочнокислых бактерий;
- Подавляет развитие патогенной кишечной микрофлоры (кишечной палочки, сальмонеллы и др.);
- Стимулирует секрецию собственных ферментов в желудке;
- Улучшает переваримость питательных веществ, в первую очередь протеинов;
- Предотвращает диарею.

ВЛИЯНИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:

Увеличивает:

- сохранность поросят и цыплят;
- потребление корма благодаря улучшению его вкуса;
- скорость роста.

Улучшает:

- конверсию корма;
- качество скорлупы яиц у кур во второй период яйцекладки.

Преимущества:

- Приятный кислый вкус в сочетании со снижением pH корма обеспечивают надежную защиту здоровья и высокую продуктивность животных и птиц;
- Эффективно подавляет патогенные микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам.

Норма применения на 1 тонну комбикорма:

- Подсосным поросятам — 3-5 кг;
- Поросятам-отъемышам, свиноматкам — 3 кг;
- Бройлерам, курам-несушкам — 2-3 кг.

Упаковка: Влагонепроницаемые бумажные мешки по 25 кг.
Внешний вид: Сыпучий порошок бежевого цвета.
Срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

KEMIN®

для тех, кто подкисляет

Kembind

закрепитель гранул

для тех, кто крепит гранулы

Kembind

закрепитель гранул

Кормовая добавка, которая способствует увеличению плотности гранул в гранулированных кормах, что способствует предотвращению потере кормов и увеличению его потребления.

Состав:

- лигносульфонаты

Применение:

Вводят в корм для КРС, свиней и птицы, во время грануляции с целью укрепления гранул, в расчете 1000-2000 г/т.

Упаковка:

Влагонепроницаемые бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг

Внешний вид:

Сыпучий порошок темно-коричневого цвета

Срок хранения:

24 месяца со дня изготовления

KEMIN®

для тех, кто крепит гранулы

Endox

антиоксидант

для тех, кто сохраняет витамины

Endox

антиоксидант

Комплексные антиоксиданты, представляющие собой синергетическую комбинацию компонентов различной природы.

Процесс самоокисления жиров является по своей природе необратимой реакцией, которую условно можно подразделить на:

1. Фазу инициации окисления под воздействием тепла, света, ионов металлов с образованием свободных радикалов;
2. Фазу цепной реакции интенсивного окисления и накопления свободных радикалов;
3. Фазу завершения с накоплением финальных продуктов окисления.

Состав:

- Хелаторы, связывающие ионы металлов, препятствующие образованию свободных радикалов и блокирующие фазу инициации;
- Соединения, прерывающие цепную реакцию окисления;
- Эмульгаторы, улучшающие распределение препарата в сырье.

СТРУКТУРА ЭНДОКСА®D сухого:

Синергическая смесь:
- хелаторов;
- антиоксидантов;
- эмульгаторов

Нейтральный носитель

Поскольку окисление жиров происходит при контакте с кислородом, чем больше поверхность этого контакта, тем выше скорость окисления. С другой стороны, чем больше поверхность контакта антиоксиданта, тем выше его эффективность. Структура ЭНДОКСА® D сухого обеспечивает огромную поверхность контакта препарата с жирами корма: 1 г ЭНДОКСА® D сухого имеет поверхность равную 44 см2. При включении в 1 тонну корма 125 г ЭНДОКСА® D сухого его суммарная поверхность составляет 5500 см2.

Норма применения на 1 тонну:

- В комбикорма — 100-125 г ЭНДОКСА® D сухого;
- В премиксы и концентраты — с таким расчетом, чтобы в конечном комбикорме содержание ЭНДОКСА® D сухого составило не менее 100-125 г/т;
- В жиры и масла — 125-1000 г РЕНДОКСА® Плюс жидкого.

Упаковка:

- ЭНДОКС® D сухой — влагонепроницаемые мешки по 25 кг;
- РЕНДОКС® Плюс жидкий — пластиковые контейнеры по 25 кг.

Срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

для тех, кто сохраняет витамины

Butter-vanilla Aroma

ароматизатор подсластитель

для тех, кто делает корма вкуснее

Butter-vanilla Aroma

ароматизатор подсластитель

Масло Ванильный Аромат сухой – для улучшения запаха и вкуса кормов для сельскохозяйственных животных.

Состав:

- гамма-ноналактон
- этил-бутиратванилин
- этил-ванилин
- бутилгидроксианизол
- двуокись кремния
- поваренная соль

Преимущества:

Масло Ванильный Аромат сухой придает кормам для сельскохозяйственных животных стойкий привлекательный запах и вкус. Благодаря этому увеличивается потребление кормов, улучшается рост и повышается продуктивность животных. Позволяет включать в рацион большее количество менее ценных и более дешевых ингредиентов. Масло Ванильный Аромат сухой не теряет свойств после грануляции корма.

Применение:

Вводят в кормовое сырье или комбикорм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Норма ввода составляет 200-500 г/тонну.

Упаковка:

Влагонепроницаемые бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг

Внешний вид:

Сыпучий порошок желтоватого цвета

Срок хранения:

24 месяца со дня изготовления

KEMIN®

для тех, кто делает корма вкуснее

Toxfin

адсорбент микотоксинов

для тех, кто ценит здоровье

Toxfin

адсорбент микотоксинов

Последствия заражения кормов плесенью:

Поражение кормов плесневыми грибками и микотоксинами приводит к ущербу, составляющему, по некоторым оценкам, сотни миллионов долларов ежегодно, и эта цифра имеет четкую тенденцию к росту. Наиболее действенным средством уменьшения ущерба от микотоксинов является строгое соблюдение технологии производства, хранения и переработки кормового сырья и кормов. Составным элементом в этой цепи является Программа обработки зерна, предложенная компанией Кемин в рамках Инициативы по безопасности (Food Safety Initiative — Fsi). Эта программа обеспечивает эффективный контроль роста плесневых грибков в процессе хранения зерна и накопления в нем микотоксинов.Однако иногда, в частности, в так называемые, «фузариозные» годы, свежеубранное зерно содержит в себе значительные концентрации микотоксинов, иногда превышающие предельно допустимые. В таких случаях производителям кормов не остается ничего, кроме использования адсорбентов микотоксинов. Их роль заключается в связывании микотоксинов в желудочно-кишечном тракте животных, формировании с ними крупных нерастворимых комплексов, не способных пройти через кишечную стенку, и выведении с пометом из организма.

ТОКСФИН® — адсорбент микотоксинов, основанный на оптимальном соотношении нескольких видов активированных минеральных компонентов с широким спектром связывания, подтвержденным результатами опытов «in vitro» и «in vivo».

Назначение:

Предотвращение микотоксикозов у сельскохозяйственных животных и птиц.

Преимущества:

- Связывает широкий спектр микотоксинов при разных значениях pH среды;
- Имеет низкую норму ввода (1-5 кг);
- Не связывает витамины и микроэлементы ;
- Не оказывает отрицательного влияния на продуктивность на фоне доброкачественных кормов ;
- Не является стимулятором роста, поэтому его эффективность обусловлена исключительно связыванием микотоксинов.

Нормы применения:

- При использовании слаботоксичных кормов — 1 кг/тонну;
- При использовании токсичных кормов — 1-3 кг/тонну;
- В случае острых микотоксикозов — 5 кг/тонну в течение ограниченного периода времени (3-4 недели).

Упаковка: Влагонепроницаемые бумажные мешки по 25 кг.

Срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

для тех, кто ценит здоровье

Sal Curb

антибактериальный препарат

для тех, кто убивает микробы

Sal Curb

антибактериальный препарат

Предназначенный для производства «чистых», свободных от патогенной микрофлоры кормов для животных и птиц

Состав:
синергический комплекс антибактериальных компонентов естественной природы, безвредных для персонала и животных.

Назначение:
- предотвращение заражения кормового сырья (рыбной муки, мясной, мясокостной муки, соевого и подсолнечного шротов и др.) и готовых комбикормов болезнетворной микрофлорой;
- обеззараживание уже зараженного кормового сырья;
- профилактика кормов, подвергнутых термической обработке, от повторного заражения;
- обеззараживание оборудования для производства кормов и емкостей для его хранения (силосов, стен и полов напольных хранилищ).

Преимущества:
Убивает сальмонеллу, кишечную палочку, другие виды патогенных энтеробактерий, обеспечивает длительную, надежную защиту от микробного заражения, полностью метаболизируется в организме животных и птиц. Безвреден для персонала, сохраняет активность после термической обработки. В сочетании с МИКО КАРБом применяется в «Программе гигиены кормов», разработанной фирмой КЕМИН ЕВРОПА.

Нормы применения:
- для профилактики заражения кормов - 1-2 кг/т;
- для обеззараживания кормов - 3-10 кг /т;
- для обеззараживания оборудования и силосов - 0,5-2 кг/10 м^3.

Способы применения:
- в кормах – через премикс или непосредственного в массу корма при условии хорошего смешивания;
- при обработке оборудования и емкостей с помощью «Распылителя для сухих продуктов» фирмы КЕМИН.

Упаковка: влагонепроницаемые бумажные мешки по 25 кг.
Срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

для тех, кто убивает микробы

Kemzyme

ферментный препарат

для тех, кто экономит

Kemzyme

ферментный препарат

Мультиэнзимный комплекс, предназначенный для применения в рационах свиней и птиц, основанных на альтернативных кукурузе и соевому шроту источниках энергии и протеина: пшенице, ячмене, овсе, ржи, подсолнечном шроте и жмыхе.

Состав:

Комплекс ферментов: р-глюканаза, целлулаза, ксиланаза, а-амилаза, протеаза, липаза, каждый из которых получен из отдельного продуцента.

Спецификация кемзаймов:

КЕМЗАЙМ W сухой — для кормов с высоким содержанием пшеницы и ржи;
КЕМЗАЙМ В — для кормов с высоким содержанием ячменя и овса;
КЕМЗАЙМ HF — для кормов с высоким содержанием подсолнечного шрота;
КЕМЗАЙМ концентрат— для рационов, основанных на пшенице и шротах;
КЕМЗАЙМ Х — для рационов, основанных на пшенице и шротах;
КЕМЗАЙМ ХР — дополнительный фитазой КЕМЗАЙМ Х.

Назначение:

- Переваривание некрахмальных углеводов в желудочно-кишечном тракте;
- Высвобождение дополнительной энергии и других питательных веществ;
- Увеличение усвоения питательных веществ;
- Рациональное использование местных кормовых ресурсов.

Влияние на хозяйственно-полезные и физиологические принципы:

- Снижение вязкости содержимого кишечника;
- Увеличение роста и продуктивности животных и птиц;
- Улучшение конверсии корма;
- Уменьшение отношения потребления воды к корму;
- Уменьшение количества выделяемого помета и содержания влаги в нем.

Преимущества:

Расщепляет все основные некрахмальные углеводы в кормах: β-глюканы, ксиланы, целлулозу. Не теряет активности после грануляции.

Нормы применения:

- КЕМЗАЙМ концентрат — 50 г/тонну комбикорма;
- КЕМЗАЙМ Х — 250 г/тонну комбикорма;
- Для остальных видов — 500 г/тонну комбикорма.

Упаковка: Влагонепроницаемые бумажные мешки по 25 кг

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

для тех, кто экономит

Lysoforte

эмульгатор жиров

для тех, кто вводит много масла

Lysoforte

эмульгатор жиров

Переваривание питательных веществ корма может происходить только в водной среде желудочно-кишечного тракта. Жиры же нерастворимы в воде, поэтому их переваривание происходит только после образования с помощью желчных кислот водно-жировой эмульсии. Фермент липаза расщепляет жиры до свободных жирных кислот и глицерина, моно- и диглицеридов. Расщепленные до разной степени жиры в тонком кишечнике формируют мицеллы, в форме которых они и всасываются. Образование мицелл происходит благодаря желчным кислотам, и некоторым ингредиентам корма. У молодых животных и птиц секреция желчных кислот и липазы недостаточна, поэтому доступность энергии из разных видов жиров у них значительно ниже.

Назначение:

- Эмульгирование жиров корма в кишечнике;
- Образование меньших по размеру мицелл;
- Повышение проницаемости клеточных стенок слизистой оболочки кишечника;
- Увеличение доступности питательных веществ корма.

Преимущества:

- Восполняет недостаточную секрецию желчных кислот;
- Имеет низкую норму ввода;
- Позволяет использовать низкоэнергетические рационы и снижать их стоимость.

Нормы применения:

В комбикорма для всех видов животных —500-1000 г/т.

Упаковка: Влагонепроницаемые мешки по 25 кг.

Срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

для тех, кто вводит много масла

KEMIN® INSPIRED MOLECULAR SOLUTIONS™

СОХРАНИ БАЛАНС…



КлоСТАТ™

Новейшее решение проблемы некротического и хронического энтерита

для тех, кто работает...

АГРОТех

ул. Хирургическая 22,
Донецк, 83049
e-mail: at@agrotex.net.ua

КлоСТАТ™

КлоСТАТ™ - новейший продукт, предназначенный для профилактики некротического энтерита. Содержит микроорганизмы уникального штамма *B.subtilis PB6*, который был выделен из кишечника цыплят, оставшихся здоровыми в стадах пораженных возбудителем некротического энтерита *Clostridium perfringens.*

НАРУШЕНИЕ БАЛАНСА МИКРОФЛОРЫ

быстро приводит к развитию субклинической формы некротического энтерита – одной из широко распространенных проблем в промышленном птицеводстве.

Исследования показали, что в мире 75-85% всех бройлерных стад страдают от субклинической формы некротического энтерита.

ВЛИЯНИЕ НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРИТА

За счет увеличения падежа и конверсии корма некротический энтерит значительно снижает прибыльность промышленного птицеводства.

Острая (клиническая) форма
Падеж возрастает до 30%
Ухудшение конверсии корма до 35%

Субклиническая форма
Увеличение падежа на 1%
Ухудшение конверсии корма и прироста живой массы до 5%

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КлоСТАТа™

- Продуцирует бактериоцины со специфической активностью против *Clostridium perfringens*
- Снижает влияние некротического энтерита наряду с поддержанием баланса ЖКТ
- Поддерживает рост полезных лакто- и бифидобактерий
- Позволяет более эффективно использовать питательные вещества корма
- Позволяет выращивать птицу без применения кормовых антибиотиков
- Повышает прибыльность птицеводства благодаря улучшению привесов и конверсии корма
- КлоСТАТ™ сохраняет свои свойства в комбикормах
- Стабилен в процессе термической обработки комбикормакорма
- Совместим со всеми органическими кислотами
- Совместим с кокцидиостатиками

Применяют в течении всего периода откорма в дозировке 500г/т корма
Гарантированное содержание *B.subtilis PB6:* 2 x 10^9 кол./кг

для тех, кто работает...
АГРОТех

За информацией обращайтесь к специалистам
факс: (062) 345 45 90 (42)
тел.: (050) 557 17 39, (067) 628 22 32
(095) 169 88 93